Studie	Fragestellung	Status der Studie
ABCSG 18 **-Open Label Phase** **-Substudie Zoledronsäure**	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Phase III Studie zur Bestimmung des Behandlungseffekts von Denosumab bei Patientinnen mit nicht metastasierendem Mammakarzinom während einer Aromataseinhibitor Therapie.	laufende Studie: Follow up
ABCSG 22R - Registerstudie	Registrierung von prämenopausalen Patientinnen mit einem hormonsensitiven Mammakarzinom unter bestehender Therapie mit Nolvadex® und Zoladex®.	laufende Studie
ABCSG 25/ PANTHER (GBG53)	Eine kontrollierte, randomisierte Phase III-Studie: An die Nebenwirkung der Patientin angepasste dosisdichte Chemotherapie mit Epirubicin und Cyclophosphamid gefolgt von Docetaxel (dtEC → dtT) im Vergleich mit einer Standard-Chemotherapie mit 5-Fluorouracil, Epirubicin und Cyclophosphamid gefolgt von Docetaxel (FEC → T).	laufende Studie: Follow-up
ABCSG 28/ POSYTIVE	Primäre Operation bei synchron metastasiertem invasivem Brustkrebs, eine prospektiv randomisierte multizentrische Studie zur Evaluierung der lokalen Therapie.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
ABCSG 36/ Penelope	Phase III Studie zur Evaluation von Palbociclib (PD-0332991) ein Hemmer der Cyclin-Kinase 4/6 bei Patientinnen mit HR+/HER2-normalem primärem Brustkrebs mit hohem Rückfallrisiko nach neoadjuvanter Chemotherapie.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
ABCSG 38/ Lorelei	Eine randomisierte, doppelblinde Phase II Studie zum Vergleich von neoadjuvantem Letrozol plus GDC-0032 versus Letrozol plus Placebo bei postmenopausalen Frauen mit ER-positivem/HER2-negativem Brustkrebs im Frühstadium.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)

ABCSG 39/ Aphinity	Randomisierter, multizentrischer, doppelblinder, Placebo-kontrollierter Vergleich von Chemotherapie + Trastuzumab + Plazebo mit Chemotherapie + Trastuzumab + Pertuzumab als adjuvante Therapie bei Patienten mit operalem HER2-positivem primärem Mammakarzinom	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
ABCSG 41/ OlympiA	Randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, multizentrische Phase-III-Parallelgruppenstudie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Olaparib im Vergleich zu Placebo als adjuvante Behandlung von PatientInnen mit BRCA1-Keimbahnmutationen und HER2-negativem Hochrisiko-Brustkrebs zu beurteilen, die eine definitive lokale und neoadjuvante bzw. adjuvante Behandlung abgeschlossen haben.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
ABCSG 42/ PALLAS	PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study: Randomisierte Phase-III-Studie mit Palbociclib zusammen mit einer adjuvanten endokrinen Standardtherapie versus adjuvante endokrine Standardtherapie allein für hormonrezeptorpositive (HR+) / HER2-negative PatientInnen mit frühem Brustkrebs.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
ABCSG 43/ INSEMA	Vergleich von axillärer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie versus keiner axillären Operation bei Patienten mit frühem invasiven Brustkrebs und brusterhaltender Operation: eine randomisierte, prospektive, chirurgische Studie.	laufende Studie: Follow-up (Rekrutierung abgeschlossen)
Lidera	A Phase III, Randomized, Open Label, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of adjuvant Giredestrant compared with Physician's Choice of Adjuvant Endocrine Monotherapy in patients with Estrogen Receptor−Positive, HER 2 Negative Early Breast Cancer.	laufende Studie:
ABCSG 61/ Teodor	Eine prospektive Phase-II-Studie, die eine personalisierte, neoadjuvante Therapie für HR+/HER2- Brustkrebs untersucht. Basierend auf ctDNA und endokriner Re-	laufende Studie

	sponsivität werden Patient:innen zwischen zielgerichteter endokriner Therapie und Chemotherapie randomisiert.	
Cambria 1 und 2	Die klinischen Phase-III-Studien CAMBRIA-1 und CAMBRIA-2 untersuchen das neuartige Medikament Camizestrant (einen oralen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader, SERD) im Vergleich zu einer Standard-Antihormontherapie bei Patientinnen und Patienten mit frühem, Hormonrezeptor-positivem (ER+/HR+), HER2- negativem Brustkrebs	laufende Studie
AdapTela Studie	Mit dieser Studie wird erforscht, ob eine Erweiterung der Antihormontherapie unter bereits laufender Therapie (Chemotherapie und/oder Operation) bei Frauen mit einem im Frühstadium behandelten hormonabhängigen Brustkrebs (Hormonrezeptor positiv; HER2-negativ), das Risiko eines Rezidivs bzw. einer Metastasierung vermindern kann.	laufende Studie